

国内最大濃度を越えたミノキシジル7%配合外用薬販売開始



市販の育毛剤の濃度は、1～5%ですが、

超高濃度ミノキシジル7%含有発毛剤（外用薬）

商品名：FOLLICS FR07

ローションタイプ

内容量：1本60ml（30日分）

健診受診日より1年間限定で10%割引の特別価格でご提供します。

金額：5,000円（税込）→ 割引後 4,500円（税込）

受診者様
限定販売


こんな髪の毛の悩みを感じていませんか？

- ✓ 最近抜け毛が気になる
- ✓ 髪が細くなった
- ✓ 髪の分け目が気になる
- ✓ 最近、髪の毛のボリュームが減った
- ✓ 育毛剤や育毛シャンプーで期待ができない

こんな効果が期待できます！

- ✓ 発毛
- ✓ 育毛
- ✓ 脱毛抑制

有効成分が掻痒感や炎症を抑え、
皮膚の深い層へ！
時間差でミノキシジルを
浸透させ育毛効果を持続!!



副作用

- ✓ 頭皮の発疹、かゆみなどの皮膚症状
- ✓ 低血圧やめまい、むくみ、心拍数増加（稀なケース）

外用薬のローションの場合、頭皮の発疹やかゆみ、赤みやフケなどの皮膚症状が最も多く報告されています。飲み薬ではないため、全身性の副作用は少ないとされていますが、頭皮から吸収された成分によって低血圧やむくみが生じる事例も報告されています。初めて使用する際には、手の甲などで試すなど、自分の肌に合うかを必ず確認してください。また、皮膚症状があらわれた場合には、すぐにミノキシジルローションを洗い流し、医師に相談することをおすすめします。

注意事項

ミノキシジルは即効性のある薬ではないため、効果を実感するには6ヶ月程度、服用を継続する必要があります。また、ミノキシジルの使用を開始してから2～6週間程度の期間に、**抜け毛が増えることがあります**。これは「初期脱毛」と呼ばれる症状です。初期脱毛は、AGAによって乱れてしまったヘアサイクルを正常化させる為に、古くなった髪の毛を一旦押し出す現象の事を指します。ミノキシジルが正常に作用している証拠でもありますので、心配する必要はありません。一時的に脱毛量が増えたとしても服用の中断はしないようにしましょう。ここで服用を中断してしまうと、服用前の状態に戻ってしまう可能性があります。初期脱毛は必ず起こるものではありませんが、もし起きてしまった場合も、焦らず治療薬の服用・使用を続けることが大切です。

次の方は使用できません

- ✓ 心疾患がある方
- ✓ 未成年
- ✓ 女性
- ✓ 高血圧または低血圧の方、あるいは降圧薬を使用の方
- ✓ 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の方
- ✓ 本剤によりアレルギー症状を起こしたことがある方

ご購入方法

購入を希望される方は、病院受付窓口にてお申し出ください。**※本品をお求めの際は、医師の診察が必要です。**

当院ではAGA（男性型脱毛症）のオンライン診療を行っておりますが、オンラインでのお申し込みは、**割引対象外**となります。オンラインでの診療をご希望の場合は、以下サイトよりお問い合わせ下さい。

AGAオンライン診療予約 : <https://shodahpaga.jp>

AGA専用メールアドレス : info@shodahpaga.jp

AGA専用回線 : 0120-836-640（8:00～21:00）【ご予約・お問い合わせ】



群馬県安中市安中1-16-32
TEL:027-382-1123

※健診・ドック受診者様限定にご案内しております。

2025.06.01