## 美容内服薬

トランサミン錠250mg	シナール配合錠 200mg	ユベラ錠50mg
	ルだ会院 (東ルナールで名談 (東ルナー)	302
O F95/985/250mg	· 上于一体设备报 上于一体设备报	<b>2√</b> '⇒50ng €362
		HIGH
主成分	主成分	主成分
トラネキサム酸	ビタミンC (アスコルビン酸) と ビタミンB5 (パントテン酸) の配合剤	ビタミンE (トコフェロール酢酸エステル)
効果・効能	効果・効能	効果・効能
トラネキサム酸はアミノ酸の一種で、しみや肝斑の改善に効果があります。紫外線などでメラニンが作られる過程を抑え、色素沈着を防ぎます。特徴は、プラスミンによるメラノサイト(メラニンをつくり出す)の活性化や炎症・アレルギー反応を抑制します。そのため、美白効果に加え、止血作用や抗炎症作用もあり、治療に使われています。	ビタミンCはシミの原因となるメラニン生成を抑え、しみや肝斑の改善、抵抗力向上、コラーゲン生成促進に役立ちます。ビタミンB5(パントテン酸)は代謝を助け、皮膚を健康に保ち、ビタミンCの働きも補います。肌の調子を整え、しみ予防・改善に効果が期待できます。	ビタミンEは強い抗酸化作用で肌の酸化を防ぎ(=老化防止)、新陳代謝を高めてメラニン沈着を抑えることで、しみやそばかすの予防、しわやたるみ防止に効果があります。肌の血行改善、肌のターンオーバーを促進して健康な皮膚を保ちます。
こんな方におすすめ	こんな方におすすめ	こんな方におすすめ
肝斑(かんぱん)を改善したい方	シミ、そばかすが気になる方	  乾燥、しわやたるみなどの肌の老化が気になる。
色素沈着を抑制したい方	ニキビや肌荒れを改善したい	冷えや血行不良による肌トラブルがある方
用法・用量	用法・用量	用法・用量
1日2〜3回 1回 1錠食後に服用	1日2~3回 1回 1錠食後に服用	1日2~3回 1回 1錠食後に服用
※より効果を実感されたい方は毎食後1錠ずつ	※より効果を実感されたい方は毎食後1錠ずつ	   ※より効果を実感されたい方は毎食後1錠ずで
副作用・禁忌事項	副作用・禁忌事項	副作用・禁忌事項
食欲不振、吐き気、発疹、胸やけ等 <b>妊娠中、授乳中の方</b> トラネキサム酸は血栓症のリスクがある 為、内服は望ましくありません。	胃の不快感、吐き気、下痢等	発疹・便秘・胃の不快感等
塞、血栓性静脈炎等)、動脈硬化、心疾 患、止血剤(トロンビン等)内服の方		
● 血栓系の病気(心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、血栓性静脈炎等)、動脈硬化、心疾患、止血剤(トロンピン等)内服の方  ● 低用量ピル内服中の方 低用量ピルは血液を固まりやすくする作用があり、トラネキサム酸も同じ副作用がある為、併用は望ましくありません。  ■ 喫煙者や肥満気味の方		
塞、血栓性静脈炎等)、動脈硬化、心疾患、止血剤(トロンビン等)内服の方  ● 低用量ピル内服中の方 低用量ピルは血液を固まりやすくする作用があり、トラネキサム酸も同じ副作用がある為、併用は望ましくありません。	料金	料金
塞、血栓性静脈炎等)、動脈硬化、心疾患、止血剤(トロンビン等)内服の方  (他用量ピル内服中の方 (他用量ピルは血液を固まりやすくする作用があり、トラネキサム酸も同じ副作用がある為、併用は望ましくありません。)  「関煙者や肥満気味の方	<b>料金</b> 100錠 2,200円(税込)	<b>料金</b> 100錠 2,200円(税込)
塞、血栓性静脈炎等)、動脈硬化、心疾患、止血剤(トロンビン等)内服の方  (他用量ピル内服中の方 (他用量ピルは血液を固まりやすくする作用があり、トラネキサム酸も同じ副作用がある為、併用は望ましくありません。)  (中国・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・		